




Exercice 4 corrigé disponible

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormal du plan. On considère les points $A(-3; 2)$, $B(4; 3)$ et $C(-1; -2)$.

- Placer les points dans le repère ci-dessous.
- Démontrer que ABC est un triangle isocèle.
- Calculer les coordonnées du point E , symétrique de A par rapport à B .
- Quelle est la nature de ACE (Justifier)?
- Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- Quelle est la nature de $ABCD$ (Justifier)?



1) On calcule AB : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$

$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$ $AB = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (3 - 2)^2}$

$BC = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (-2 - 3)^2}$ $AB = \sqrt{49 + 1}$

$BC = \sqrt{25 + 25}$ $AB = \sqrt{50}$

$BC = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ $AB = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2}$

$BC = AB$ donc le triangle ABC est isocèle en B . $= 5\sqrt{2}$

3) B est ainsi le milieu de $[AE]$.

$$x_B = \frac{x_A + x_E}{2} \text{ et } y_B = \frac{y_A + y_E}{2}$$

$$x_B = \frac{x_A + x_E}{2} \text{ et } y_B = \frac{y_A + y_E}{2}$$

$$2 \times 4 = \frac{-3 + x_E}{2} \times 2 \quad 2 \times 3 = \frac{2 + y_E}{2} \times 2$$

$$8 = -3 + x_E \quad 6 = 2 + y_E$$

$$8 + 3 = x_E \quad 6 - 2 = y_E$$

$$x_E = 11$$

$$y_E = 4$$

$$E(11; 4)$$

4. Le point B est le milieu de $[AE]$ ($B = m[AE]$)
 De plus par symétrie et construction $BA = BE = BC$
 B est donc le centre du cercle circonscrit de triangle ACE
 est rectangle en C .

5. Calculons les coordonnées du milieu de $[AC]$ qu'on note I .

$$x_I = \frac{x_A + x_C}{2} = \frac{-3 + (-1)}{2} = -2$$

$$y_I = \frac{y_A + y_C}{2} = \frac{2 + (-2)}{2} = 0$$

Comme ABCD est un parallélogramme, ses diagonales [AC] et [BD] se coupent en leur milieu. Donc:

$$x_I = \frac{x_B + x_D}{2} \quad y_I = \frac{y_B + y_D}{2}$$

$$2 \times -2 = \frac{4 + x_D}{2} \times 2 \quad 2 \times 0 = \frac{3 + y_D}{2} \times 2$$

$$-4 = 4 + x_D$$

$$-4 - 4 = x_D$$

$$x_D = -8$$

$$0 = 3 + y_D$$

$$y_D = -3$$


ABCD est un parallélogramme donc:
 $AB = DC$ et $AD = BC$. } $AB = BC = CD = DA$.
 Or $AB = BC$
 Il s'agit d'un losange.

Exercice n° 6.

Exercice 6 corrigé disponible

ABEC est un carré.

- 1°) Déterminer les coordonnées des points A, B, E et C dans le repère (A, C, B).
- 2°) Calculer les coordonnées du point F milieu de [EC] et placer F.
- 3°) Placer le point D tel que D(0; 1,5).
- 4°) Démontrer que les droites (DF) et (BC) sont parallèles.




- 1) $A(0;0)$ $E(1;1)$
 $B(0;1)$ $C(1;0)$

$$2) \left. \begin{aligned} x_F &= \frac{x_E + x_C}{2} = \frac{1+1}{2} = 1 \\ y_F &= \frac{y_E + y_C}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\} F\left(1; \frac{1}{2}\right)$$

4) $(BD) \parallel (CF)$ car les côtés opposés du carré ABEC sont parallèles. De plus, par construction, $BD = CF$.
 Ainsi le quadrilatère ABEC est un parallélogramme.
 Finalement, $(BC) \parallel (FD)$.

Exercice 9. 1)



2) Calculons
les longueurs
suivantes :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$AB = \sqrt{(-2 - (-3))^2 + (2 - (-1))^2}$$

$$AB = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2}$$

$$AC = \sqrt{(3 - (-3))^2 + (-3 - (-1))^2}$$

$$AC = \sqrt{36 + 4} = \sqrt{40}$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2}$$

$$BC = \sqrt{(3 - (-2))^2 + (-3 - 2)^2}$$

$$BC = \sqrt{25 + 25}$$

$$BC = \sqrt{50}$$

D'une part $AC^2 + AB^2 = \sqrt{40}^2 + \sqrt{10}^2 = 40 + 10$

$$AC^2 + AB^2 = 50$$

D'autre part $BC^2 = \sqrt{50}^2 = 50$.

On remarque que $AC^2 + AB^2 = BC^2$ donc

d'après la réciproque du théorème de Pythagore,
le triangle ABC est rectangle en A.

3) Le triangle ABC est rectangle en A, donc le centre du
cercle inscrit M est le milieu de l'hypoténuse [BC].

$$M \left(\frac{x_B + x_C}{2}; \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

$$M \left(\frac{-2 + 3}{2}; \frac{2 + (-3)}{2} \right)$$



$$M \left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2} \right)$$

4) Le cercle \mathcal{C} a pour rayon $MB = \frac{1}{2} BC$


$$MB = \frac{1}{2} \sqrt{50}$$

$$r_B = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} = \boxed{\frac{5\sqrt{2}}{2}}$$

5) Rappel:




$$A = \frac{b \times h}{2}$$



$$A_{\text{triangle}} = \frac{b \times h}{2} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{\sqrt{10} \times \sqrt{40}}{2}$$

$$= \frac{\sqrt{400}}{2} = \frac{20}{2} = \boxed{10 \text{ u.a.}}$$

$$A = \frac{b_1 \times h_1}{2}$$



$$A(ABC) = 10 \text{ u.a.}$$


$$\frac{BC \times h}{2} = 10$$

$$\cancel{2} \times \frac{\sqrt{50} \times h}{\cancel{2}} = 10 \times \cancel{2}$$


$$\sqrt{50} \times h = 20$$


$$h = \frac{20}{\sqrt{50}}$$

$$h = 2\sqrt{2} \approx 2,82$$






- Vecteurs:
- direction.
 - sens.
 - valeur, norme, intensité





$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$




Repérage et coordonnées – Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible

On considère la figure ci-contre.


- Déterminer, sans justifier, les coordonnées des huit points de la figure :
 - dans le repère $(O; I; J)$;
 - dans le repère $(I; O; C)$.
- Placer le point $F(-2; -1)$ dans le repère $(J; O; C)$.
- Placer le point $G(2; -3)$ dans le repère $(D; I; E)$.



Exercice 2 corrigé disponible

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormal du plan. On considère les points $A(-5;0)$, $B(-1;-2)$ et $C(1;2)$.


- Placer les points dans le repère ci-dessous.
- Calculer les coordonnées de K , le milieu de $[AC]$.
- Démontrer que K est le centre du cercle circonscrit à ABC .
- Que peut-on en déduire (justifier la réponse)?



Exercice 3 corrigé disponible

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormal du plan. On considère les points $R(-9;-1)$, $E(-6;-6)$, $C(9;3)$ et $T(6;8)$.


- Placer les points dans le repère ci-dessous.
- Démontrer que $RECT$ est un parallélogramme.
- Indiquer deux méthodes permettant de démontrer que $RECT$ est un rectangle.
- Rédiger une des deux méthodes précédentes.



Exercice 4 corrigé disponible

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormal du plan. On considère les points $A(-3;2)$, $B(4;3)$ et $C(-1;-2)$.

1. Placer les points dans le repère ci-dessous.
2. Démontrer que ABC est un triangle isocèle.
3. Calculer les coordonnées du point E , symétrique de A par rapport à B .
4. Quelle est la nature de ACE (Justifier) ?
5. Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
6. Quelle est la nature de $ABCD$ (Justifier) ?



Exercice 5 corrigé disponible


Soit (O, I, J) un repère orthonormal, on considère les points $A(-1;1)$, $B(1;2)$ et $C(3;-2)$.

- 1°) Faire une figure que l'on complètera par la suite.
- 2°) Calculer les longueurs AB , AC et BC .
- 3°) Quelle est la nature du triangle ABC . Justifier.
- 4°) Calculer les coordonnées du point M , milieu de $[AC]$ et placer le point M .
- 5°) Déterminer les coordonnées du point D symétrique de B par rapport à M .
- 6°) Quelle est la nature du parallélogramme $ABCD$? Justifier.

Exercice 6 corrigé disponible

$ABEC$ est un carré.

- 1°) Déterminer les coordonnées des points A, B, E et C dans le repère (A, C, B) .
- 2°) Calculer les coordonnées du point F milieu de $[EC]$ et placer F .
- 3°) Placer le point D tel que $D(0;1,5)$.
- 4°) Démontrer que les droites (DF) et (BC) sont parallèles.



Exercice 7 corrigé disponible

Soit $A(-3; -5), B(6; -2), C(3; 1), H(6; -4)$.

On note \mathcal{C} le cercle de diamètre $[AB]$.

1. Placer les points A, B et C .
2. Déterminer les coordonnées de K milieu de $[AB]$.
3. Tracer le cercle \mathcal{C} .
4. Le point C est-il un point du cercle \mathcal{C} ?
5. Le point H est-il un point du cercle \mathcal{C} ?
6. ABC est-il un triangle rectangle ? Justifier.

Exercice 8

Soit (O, I, J) un repère orthonormé d'unité 2cm.

Soient $A(2, 2)$, $K(0, 3)$, $L(1, 4)$ et $H(1, 3)$.


1. Faire une figure que l'on complétera au fur et à mesure.
2. Soit \mathcal{C} le cercle de centre A passant par I .
 - (a) Déterminer la mesure exacte du rayon de \mathcal{C} .
 - (b) Vérifier par le calcul que $K \in \mathcal{C}$ et $L \in \mathcal{C}$.
 - (c) Calculer les coordonnées du milieu M de $[KI]$ et du milieu M' de $[KL]$.
 - (d) Soit D la droite perpendiculaire à (KI) passant par M . Construire (D) à l'aide d'un compas en laissant les traits de construction apparents.
 - (e) Même question D' la droite perpendiculaire à (KL) passant par M' .
 - (f) Les droites D et D' sont des droites remarquables du triangle IKL . Lesquelles ? Expliquer pourquoi D et D' se coupent en A .
 - (g) Comparer les abscisses des points I, H et L . Que peut-on en conclure pour ces trois points ?
 - (h) Montrer que le triangle IKH est rectangle en H .
 - (i) La droite (KH) est une droite particulière du triangle IKL . Laquelle ? En déduire l'aire du triangle IKL .
3. Soit K' le symétrique de L par rapport à A .
 - (a) Donner, en la justifiant, la nature du triangle $IK'L$.
 - (b) Calculer les coordonnées de K' ainsi que les distances $K'I$ et IL .
 - (c) Déterminer l'aire du triangle $IK'L$.
4. Hachurer la partie du disque de centre A et de rayon AI qui n'est pas dans le quadrilatère $IKLK'$. Calculer l'aire exacte de la zone hachurée.

Exercice 9

Soit (O, I, J) un repère orthonormé du plan.

On considère les points $A(-3; -1)$, $B(-2; 2)$, $C(3; -3)$

1. Faire une figure dans le repère ci-dessous, qui sera complétée par la suite.
2. Démontrer que ABC est rectangle en A .
3. Déterminer les coordonnées du point M , centre du cercle \mathcal{C} circonscrit au triangle ABC .
4. Calculer le rayon de ce cercle \mathcal{C} .
5. Calculer l'aire du triangle ABC .
6. Soit H le pied de la hauteur issue de A dans le triangle ABC . En exprimant l'aire du triangle ABC de deux façons, calculer la longueur AH




Les vecteurs du plan - Fiche de cours

1. Les vecteurs du plan

a. Définition


Un vecteur est un objet géométrique défini par :

- Une direction
- Un sens
- Une norme



b. Notion de translation

Une translation est une transformation du plan qui réalise le glissement de tous les points du plan selon un même déplacement




Ce déplacement peut être caractérisé par un vecteur :

$$\vec{AA'} = \vec{BB'} = \vec{CC'}$$

c. Opposé d'un vecteur

L'opposé d'un vecteur est caractérisé comme la translation en sens inverse de ce vecteur




d. Egalité de vecteurs

2 vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont :

- même direction
- même sens
- même norme

$$-\vec{BA} = \vec{AB}$$



2. Somme vectorielle

a. Définition

La somme de 2 vecteurs est une opération algébrique égale à un vecteur :



$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{w}$$

b. Propriétés algébriques

- commutativité : $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- élément neutre : $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
- opposé : $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$

c. Propriété géométrique

La relation « dite de Chasles » utilise la somme vectorielle



$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

$\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$

$\vec{AC} + \vec{CB} = \vec{AB}$

$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

3. Multiplication par un réel non nul

a. Définition

Multiplier un vecteur par un réel k non nul est :

- un vecteur de même sens si $k > 0$
- un vecteur de sens opposé si $k < 0$


b. Vecteurs colinéaires

Lorsque $\vec{v} = k\vec{u}$ les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires

c. Alignement de 3 points

Soient 3 points du plan A, B, C

$$\vec{AC} = k\vec{AB} \Leftrightarrow A, B, C \text{ alignés}$$



$\vec{u} = 3\vec{v}$


$\vec{u} = \sqrt{2}\vec{v}$

$\vec{u} = -3\vec{v}$

4. Autres propriétés

a. Vecteurs et parallélogramme


Soient 4 points du plan A, B, C et D :



$$\vec{AB} = \vec{DC} \Leftrightarrow ABCD \text{ parallélogramme}$$

b. Milieu


Soient 3 points du plan A, B et I milieu de [AB]



$$I \text{ milieu de } AB \Leftrightarrow \vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{IB} = \frac{1}{2}\vec{AB}$$

c. Centre de gravité

Soit le triangle ABC et G le centre de gravité



$$G \text{ centre de gravité de } ABC \Leftrightarrow \vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{GA} = \frac{2}{3}\vec{A'A}$$

4. Vecteurs et coordonnées

a. Coordonnées d'un vecteur

Soient 2 points du plan A $(x_A ; y_A)$ et B $(x_B ; y_B)$

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

b. Egalité de vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ du plan

$$\vec{u} = \vec{v} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x = x' \\ y = y' \end{pmatrix}$$

c. Opérations algébriques

- somme

Soient les vecteurs $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ du plan

$$\vec{u} + \vec{v} \begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$$

- multiplication par un réel

Soient le vecteur $\vec{u}(x ; y)$ et k réel non nul

$$\vec{u} \begin{pmatrix} kx \\ ky \end{pmatrix}$$

d. Déterminant de 2 vecteurs

Soient les vecteurs $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ du plan

On définit $|\vec{u} ; \vec{v}| = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y$

$$|\vec{u} ; \vec{u}| = 0 \quad |\vec{u} ; \vec{v}| = |\vec{v} ; \vec{u}|$$


e. Critère de colinéarité

Soient les vecteurs \vec{u}, \vec{v} du plan \vec{u}, \vec{v} colinéaires $\Leftrightarrow |\vec{u} ; \vec{v}| = 0$

Les vecteurs du plan – Exercices - Devoirs

Exercice 1 corrigé disponible

Le segment $[AB]$ est divisé en 6 parties de même longueur.



Compléter les relations suivantes par :

• la lettre qui convient :


- 1) $\vec{EC} = -2 \vec{EF}$
- 2) $\vec{CA} + \vec{FG} = 0$
- 3) $\vec{AB} = \frac{3}{2} \vec{AF}$

• le nombre qui convient :

- 4) $\vec{CE} = \frac{1}{3} \vec{AB}$
- 5) $\vec{AD} = \dots \vec{BF}$
- 6) $\vec{DE} = \frac{-1}{2} \vec{BF}$

Exercice 2 corrigé disponible

Placer les points M et N tels que $\vec{AM} = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{AN} = \vec{w} - \vec{v}$




Exercice 3 corrigé disponible

1. Reproduire la figure. Construire les points B, C et D tels que :

$$\vec{AB} = \vec{u} + \vec{v};$$


$$\vec{AC} = \vec{u} - \vec{v};$$

$$\vec{AD} = 2\vec{u}.$$



2. Que peut-on dire du quadrilatère ABDC ? Justifier votre réponse.


Exercice 4 corrigé disponible



1. Construire le point M défini par $\vec{MA} - 3\vec{MB} = \vec{BC}$
2. Les droites (BM) et (AC) sont-elles parallèles ?

Exercice 5 corrigé disponible

Sur le dessin ci-dessous, le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme.



1. Placer les points E et F tels que $\vec{EA} = -3\vec{AD}$ et $\vec{CF} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AD}$.
2. Exprimer le vecteur \vec{EC} en fonction des vecteurs \vec{AB} et \vec{AD} .
3. Les points E , C et F sont-ils alignés ?

Exercice 6 corrigé disponible

$ABCD$ est un parallélogramme.

- 1) Construire les points E et F définis par : $\vec{AE} = \frac{3}{2}\vec{AB}$ et $\vec{DF} = -2\vec{DA}$.
- 2) Montrer que $\vec{FE} = \frac{3}{2}\vec{AB} - 3\vec{AD}$ et que $\vec{CE} = \frac{1}{2}\vec{AB} - \vec{AD}$.
- 3) En déduire que E , F et C sont alignés.

2/9


Exercice 7 corrigé disponible

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unités graphiques 1 cm sur chaque axe)

1. a) Placer les points $A(-2; 2)$, $B(3; 1)$, $C(1; -2)$ et $D(-4; -1)$.
b) Calculer les coordonnées des vecteurs \vec{AB} et \vec{DC} . En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$
2. Calculer les coordonnées du point E tel que $OAEB$ soit un parallélogramme.

Exercice 8 corrigé disponible

ABC est un triangle.



1. Placer le point M défini par $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{AC}$.
2. Soit N le point défini par $\vec{AN} + \vec{BN} = \vec{CB}$.
 - a) Montrer que $\vec{BN} = -\frac{1}{2}\vec{AC}$.
 - b) Placer le point N .
3. Les points B , M et N sont-ils alignés ?

Exercice 9 corrigé disponible

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on considère les points $A(-1; 2)$, $B(1; -3)$ et $C(4, 4)$.

8. Les coordonnées du vecteur \vec{AB} sont :
- a) $\vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}$ b) $\vec{AB} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ c) $\vec{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$
9. Le triangle ABC est :
- a) rectangle en A b) équilatéral c) quelconque
10. M est le milieu du segment $[BC]$:
- a) $\vec{MB} = \vec{MC}$ b) $MA = MB$ c) $M \left(\frac{3}{2}; \frac{7}{2} \right)$

Exercice 10 corrigé disponible

Le plan est muni d'un repère orthonormé (unités graphiques 1 cm sur chaque axe)

- Dans le repère ci-dessous, placer les points $A(-4; -3)$, $B(-1; 3)$ et $C(3; 1)$.
- Calculer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme puis, placer D sur la figure.
- Calculer les coordonnées du centre I du parallélogramme $ABCD$.
- Soit M le point défini par


$$6\vec{BM} = 4\vec{AC} + 7\vec{CB}$$

- Démontrer que $\vec{BM} = -\frac{2}{3}\vec{BA} - \frac{1}{2}\vec{BC}$.
 - Construire le point M sur la figure (on laissera apparents les traits de construction).
 - Calculer les coordonnées de M .
5. Les points D , I et M sont-ils alignés ? Justifier la réponse.

Exercice 11 corrigé disponible

On considère le rectangle $MNPQ$ ci-contre. On désigne par A, B, C, D les milieux respectifs de $[MN]$, $[NQ]$, $[PQ]$, $[QM]$. Compléter les égalités suivantes en utilisant les points de la figure.

- $\vec{AB} + \vec{AD} =$
- $\vec{BD} + \vec{BP} =$
- $\vec{AC} + \vec{DB} =$
- $\vec{AD} + \vec{AB} + \vec{CB} + \vec{CD} =$
- $\vec{MA} + \vec{DC} =$
- $\vec{CP} + \vec{BA} =$
- $2\vec{NB} + \vec{CD} =$




Exercice 12 corrigé disponible

Soit A, B, C et D quatre points du plan. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes :

- | | Vrai | Faux |
|---|--------------------------|--------------------------|
| \vec{AB} et \vec{BA} ont même direction. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| \vec{AB} et \vec{BA} ont même sens. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| \vec{AB} et \vec{BA} ont même norme. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| \vec{AB} et $2\vec{AB}$ ont même direction. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| \vec{AB} et $2\vec{AB}$ ont même sens. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| \vec{AB} et $2\vec{AB}$ ont même longueur. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Si $\vec{AC} = \vec{BC}$ alors C est le milieu de $[AB]$. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Si $\vec{AB} = \vec{CD}$ alors $ABCD$ est un parallélogramme. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Exercice 13 corrigé disponible



Compléter la figure suivante (en faisant apparaître les traits de construction) :

- Construire le point A' tel que $\vec{AA'} = \vec{AB} + \vec{CD}$.
- Construire le point P tel que $\vec{BP} = \vec{BC} + \vec{BH}$.
- Construire le point U tel que $\vec{KU} = \vec{KE} + \vec{LE}$.
- Construire le point N tel que $\vec{FN} = -\frac{1}{3}\vec{u}$.
- Construire le point M tel que $\vec{GM} = \frac{1}{3}\vec{u} - 2\vec{v}$.

Exercice 14 corrigé disponible

On se place dans un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Soient les points $A(-\frac{7}{2}; 2)$, $B(-2; 5)$, $C(5; \frac{13}{2})$, $D(3; \frac{5}{2})$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs \vec{AB} et \vec{CD} .
2. En déduire que le quadrilatère ABCD est un trapèze.
3. On définit le point I par l'égalité : $\vec{IA} = \frac{3}{4} \vec{ID}$.


Montrer que les coordonnées de I sont $(-23; \frac{1}{2})$.

4. Les points I, B et C sont-ils alignés ?
5. J et K étant les milieux respectifs de [AB] et [CD], déterminer les coordonnées de J et K.
Démontrer alors que les points I, J et K sont alignés.

Exercice 15

Compléter l'énoncé si-dessous :

1. $\vec{EI} + \vec{FG} = \vec{E} \dots$
2. $\vec{JG} + \vec{JB} = \vec{J} \dots$
3. $\vec{GF} + \vec{GH} + \vec{EI} =$
4. $\vec{CH} + \vec{CJ} + \vec{BH} =$
5. $\vec{EI} - \vec{GF} =$
6. $\vec{HE} + \vec{BI} - \vec{JF} =$
7. $\vec{FG} - \vec{IF} - \vec{GE} =$



Exercice 16

On donne $A(2; -2)$, $B(-1; 4)$, $C(4; -3)$.

1. Déterminer les coordonnées de M tel que

$$\vec{AM} = 2\vec{AB} - \vec{AC}$$

2. Déterminer les coordonnées de I milieu de [AB].

Exercice 17

Montrer que pour tout point A, B, C, D, E du plan :


$$\vec{CA} - \vec{BA} + \vec{DE} = \vec{DB} + \vec{CE}$$

Exercice 18

Dans un repère $(O; I; J)$, on considère les points suivants :

$$A(3; 0) \quad B(-3; -1) \quad C(-1; 2) \quad K(-6; -2)$$

1. Placer les points dans le repère. On complètera la figure au fur et à mesure des questions.
2. Calculer les coordonnées de D tel que ABCD soit un parallélogramme.
3. Calculer les coordonnées de I, centre du parallélogramme ABCD.
4. Soit M un point de l'axe des abscisses. Déterminer les coordonnées de M pour que B, C, M soient alignés.




Exercice 19

Dans un repère orthogonal on donne les points $A(-3; 1)$, $B(1; 3)$, $C(1; -4)$, $D(7; -1)$.
Les droites suivantes sont-elles parallèles ?

1. (AB) et (CD).
2. (AC) et (BD).

Exercice 20

On considère le triangle ABC . P est un point de (AB) , Q un point de (BC) et R un point de (AC) , disposés comme sur le dessin. (Les graduations sur les droites sont régulières.)



1. Donner les valeurs des réels α , β et γ tels que :

$$\overrightarrow{AP} = \alpha \overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{AR} = \beta \overrightarrow{AC}, \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BQ} = \gamma \overrightarrow{BC}.$$

2. On se place dans le repère $(A; B, C)$. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, P, R .

3. a) Déterminer le vecteur \overrightarrow{AQ} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .

- b) En déduire que $Q \left(\frac{4}{7}; \frac{3}{7} \right)$


4. Montrer que les points P, R et Q sont alignés.

Exercice 21

Soit $(O; \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan. Soient $A(-5; 2)$, $B(2; 7)$, $C(-2; -1)$.

Vous complétez la figure ci-jointe au cours de l'exercice.


1. Déterminer les coordonnées du point I milieu de $[BC]$.
2. Soit D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme. Déterminer les coordonnées de D .
3. Déterminer les coordonnées de E tel que $2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AE}$.
4. Soit $H(-3; 0)$. Montrer que les points E, I et H sont alignés.



Exercice 22

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Placer les points $A(-2; 2)$, $B(1; 0)$, $C(-1; -3)$ et $D(-4; -1)$.
2. Montrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
3. Montrer qu'il s'agit d'un carré.



- 5) Construire le point H défini par l'égalité : $\overrightarrow{CH} = \overrightarrow{DE} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$.
- 6) Construire le point I défini par l'égalité : $\overrightarrow{AI} - 2\overrightarrow{CI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.
- 7) Nous allons maintenant démontrer quelques propriétés de la figure.
 - a. Grâce aux questions précédentes, donner deux vecteurs égaux à \overrightarrow{BD} , un vecteur égal à \overrightarrow{CB} , une somme de vecteurs égale à \overrightarrow{BG} et simplifier cette somme.
 - b. A l'aide des égalités précédentes, démontrer que :
 - C est le milieu de $[AE]$
 - $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{ED}$
 - I est le milieu de $[ED]$

Exercice 28

On considère un triangle ABC .

- 1) Construire D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- 2) Construire I tel que C soit le milieu de $[AI]$.
- 3) Construire J tel que $ADIJ$ soit un parallélogramme.
- 4) Démontrer que C est le milieu de $[DJ]$.
- 5) Donner une égalité vectorielle correspondant à chacune des questions précédentes. Démontrer alors que $ABJC$ est un parallélogramme.

Exercice 29

Pour chaque ligne, répondre par Vrai ou Faux aux quatre affirmations correspondant aux données.


Attention : une réponse correcte rapporte 0,25 point mais une mauvaise réponse fait perdre 0,25 point.

Une absence de réponse ne fait rien perdre ni rien gagner. Le total de l'exercice sera ramené à 0 en cas de total négatif.

Données : $ABCD$ est un parallélogramme

I est le milieu de $[EF]$

M, G et H sont alignés et tels que :



$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$	V ou F	$\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$	V ou F	$\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{DA}$	V ou F	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD}$	V ou F
$\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{EI}$		$\overrightarrow{IF} + \overrightarrow{EI} = \vec{0}$		$\overrightarrow{EF} = -2\overrightarrow{IE}$		\overrightarrow{EI} et \overrightarrow{FI} sont opposés	
$\overrightarrow{MG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{GH}$		\overrightarrow{MG} et \overrightarrow{MH} ont la même direction		$\overrightarrow{MG} + 2\overrightarrow{MH} = \vec{0}$		$2\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{MH} = \vec{0}$	

Exercice 30

ABC est un triangle. Sur la figure ci-jointe, laisser apparent les éventuels traits de construction.

- 1) Placer le point D , image du point A par la translation de vecteur \overrightarrow{CB} .
- 2) Placer le point E , image du point B par l'enchaînement des translations de vecteurs \overrightarrow{AC} et \overrightarrow{BC} .
- 3) Placer les points F et G tels que $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{BG} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$.
- 4) Placer les points H et I tels que $\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{BH} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{BI} - 2\overrightarrow{AI} = -2\overrightarrow{CI}$.
- 5) Montrer que H est le milieu de $[BC]$.

Exercice 31

On se place dans un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Soient les points $A(-\frac{7}{2}; 2)$, $B(-2; 5)$, $C(5; \frac{13}{2})$, $D(3; \frac{5}{2})$.

1. Déterminer les coordonnées des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{CD} .
2. En déduire que le quadrilatère $ABCD$ est un trapèze.
3. On définit le point I par l'égalité : $\overrightarrow{IA} = \frac{3}{4}\overrightarrow{ID}$.

Montrer que les coordonnées de I sont $(-23; \frac{1}{2})$.

4. Les points I , B et C sont-ils alignés ?
 5. J et K étant les milieux respectifs de $[AB]$ et $[CD]$, déterminer les coordonnées de J et K .
- Démontrer alors que les points I , J et K sont alignés.

Exercice 32

ABC est un triangle.

1. Placer les points D , E et F tels que : $\overrightarrow{AD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BE} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$ et F est le milieu de $[AC]$.
2. Exprimer, en justifiant, le vecteur \overrightarrow{AB} en fonction de \overrightarrow{FE} .
3. a) Exprimer le vecteur \overrightarrow{AE} en fonction de \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} .
b) En déduire un réel k tel que $\overrightarrow{AD} = k\overrightarrow{AE}$.
c) Que peut-on alors conclure ?
4. a) Placer le point M tel que : $\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} = \vec{0}$
b) Placer le point G symétrique de F par rapport à C .
Montrer que $\overrightarrow{GA} = \frac{3}{2}\overrightarrow{CA}$ puis que $\overrightarrow{GD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB}$.
c) En déduire la nature du quadrilatère $AMDG$.

Exercice 33

ABC est un triangle

1. Placer les points H et G vérifiant les relations suivantes :

$$\overrightarrow{AH} = -\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BG} = -\frac{7}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BC}$$

2. On choisit le repère $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$

a) Donner les coordonnées des points A, B et C dans ce repère.

b) Déterminer les coordonnées des points H et G dans ce repère.

3. Les points A, G et H sont-ils alignés ?

Exercice 34

1. Écrire un algorithme en langage naturel qui teste si trois points $A(x_A ; y_A)$, $B(x_B ; y_B)$ et $C(x_C ; y_C)$ sont alignés.

2. Programmer cet algorithme avec Python.

Exercice 35

1. Construire un triangle ABC ainsi que les points B' et D tels que $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{DA} = \overrightarrow{BC}$.

2. Montrer que les points D, B et B' sont alignés.

Exercice 36

Soient \vec{m} et \vec{n} deux vecteurs du plan.

Les vecteurs $-12\vec{m} + 4\vec{n}$ et $9\vec{m} - 3\vec{n}$ sont-ils colinéaires ?

Exercice 37

On souhaite démontrer la proposition suivante : « Dans un repère orthonormé, les vecteurs non nuls $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont colinéaires si, et seulement si, leur déterminant est nul. »

1. On suppose que \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires. Après avoir rappelé la définition de la colinéarité de deux vecteurs, démontrer que $\det(\vec{u} ; \vec{v}) = 0$.

2. On suppose maintenant que $\det(\vec{u} ; \vec{v}) = 0$.

a. On se place dans le cas où au moins un des quatre nombres x , x' , y et y' est égal à 0. Démontrer que, dans ce cas, \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires.

b. On suppose maintenant que tous les nombres x , x' , y et y' sont différents de 0. Démontrer que $\frac{x}{x'} = \frac{y}{y'}$ et conclure.

Exercice 38

Dans chaque cas, déterminer le nombre réel a tel que \vec{u} et \vec{v} soient colinéaires.

1. $\vec{u}\begin{pmatrix} 5 \\ -8 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} a \\ 25 \end{pmatrix}$

2. $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -7 \\ 12 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} -2 \\ 7 \\ a \end{pmatrix}$

3. $\vec{u}\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix} a \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

Exercice 39


- On donne les points $A(-3; -2)$, $B(5; 3)$ et $C(13; 8)$.
Les points A , B et C sont-ils alignés ?
- On donne les points $A(1; 5)$, $B(-5; 20)$, $C(-2; 7)$ et $D(2; -3)$.
Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ?

Exercice 40

Dans un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) , on considère les points suivants :

$$A(3; -1) ; B(7; 4) \text{ et } C(-3; 3)$$

- Placer les points A , B et C sur l'annexe 2.
- Calculer les coordonnées des vecteurs : \vec{AB} , \vec{AC} et \vec{BC} .
- Calculer les coordonnées du milieu I de $[BC]$, du milieu J de $[AC]$ et du milieu K de $[AB]$.
- Calculer les distances AB , AC , et BC .
- Le triangle ABC est-il isocèle ? Si oui, en quel sommet ? (justifier la réponse)
- Le triangle ABC est-il rectangle ? Si oui, en quel sommet ? (justifier la réponse)



Exercice 41

Dans un repère orthonormé, on donne les points suivants : $A(2; 5)$, $B(-4; -1)$, $C(-5; 6)$ et $I(-1; 2)$

- Montrer que les droites (AB) et (CI) ne sont pas parallèles.
- Calculer les coordonnées des vecteurs : \vec{AI} et \vec{IB} . Que peut-on en déduire ?
- Calculer les longueurs : AC et BC . En déduire que les droites (CI) et (AB) sont perpendiculaires.

Exercice 42

Soit $(O; I; J)$ un repère orthonormé du plan. $A(-1; 1)$, $B(-2; -1)$, et $C(2; 2)$.

- Déterminer les coordonnées de D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.
- Déterminer les coordonnées de E symétrique de C par rapport à A .
- Déterminer les coordonnées de F vérifiant

$$\vec{AF} = 2\vec{AC} + 3\vec{AB}$$

- Les points E, B, F sont-ils alignés ?
- Soit $K(2; y)$ tel que ABK rectangle en A .
 - Placer K sur le graphique.
 - Déterminer K par le calcul.